

阿佛丁,即用型三溴乙醇溶液 1.25%(小鼠)



产品详情

产品货号	产品名称	储存条件	保质期
S19536	阿佛丁,即用型三溴乙醇溶液 1.25%(小鼠)	4℃ 避光	1 年

产品应用:

仅用于小鼠麻醉。

推荐麻醉计量:

请提前做预实验确定剂量,推荐小鼠注射剂量为 20ul/g,腹腔注射。


(如用于大鼠请购买货号 S19686, 2.5%阿佛丁(三溴乙醇)即用型无菌溶液)

麻醉起效时间:<5min

麻醉维持时间:30-50min

使用方法:

1. 用 1ml 注射器抽取麻醉剂,排空气泡。
2. 抓住小鼠,使其呈头朝下,尾朝上,以便让腹腔的脏器顺势倒向头胸部,减少刺伤脏器的机会。
3. 选择小鼠的左侧或者右侧的下腹部为穿刺点,避开肝脏和较低中腹部膀胱。将已经抽取好的药物针尖水平刺入皮肤内后,调整角度,使针头与腹部呈 45°,刺透腹膜进入腹腔,缓缓地推入药液,注射后缓慢退出针头。
4. 给药后做好保温工作,减轻动物因体温下降导致的寒颤。
5. 麻醉后动物自然倒下,头、四肢、尾巴、胡须无触碰反应,仰卧时心跳及呼吸均匀,肌肉松弛视为达到完全麻醉状态,可进行后续实验操作。



注意事项:

1. 开封后推荐 2 周内使用完毕。
2. 使用前请务必确定标签上保质期,并观察是否变色或有结晶析出。如果有晶体吸出,可以 37 度水浴溶解;
3. 正式实验前请先进行预实验。
4. 使用量需根据实际情况自行调整,如果需要延长麻醉时间,可按初始剂量 1/3 补打,请实验者根据需求进行预实验。
5. **本品为非管制药物。**
6. 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
7. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
8. 实验结果受多种因素影响,相关处理仅限于产品本身,不涉及其他赔偿。

免责声明: 本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话:13564444959

官网:www.followme-shop.com

地址:北京市海淀区东北旺西路 58 号尚科办公社区 C 区一楼



公众号



客服