

人绒毛膜癌细胞 JEG-3

Human Choriocarcinoma Cells ,JEG3



产品详情

产品货号	产品名称	储存条件
EC-JEG-3	人绒毛膜癌细胞 JEG-3	常温/-80℃

基本信息：

中文名称	人绒毛膜癌细胞 JEG-3
细胞简称	JEG-3
细胞别称	Jeg-3; JEG3; Jeg3; jeg3
细胞形态	上皮细胞样
生长特性	贴壁生长
培养方案	生长培养基：MEM(含 NEAA) + 10% FBS + 1% P/S 培养条件：气相：空气，95%；CO2，5%；温度：37℃ 注意：该细胞培养体系较为特殊且对血清质量较为敏感，我公司建议选择人绒毛膜癌细胞 JEG-3 专用培养基。
冻存条件	55%基础培养基+40%FBS+5%DMSO 液氮
传代步骤	1.首次传代，建议 1:2 传代，弃去旧培养基。 2.加入 2mL 左右 PBS，轻轻晃动培养瓶润洗细胞，吸出 PBS 丢弃。 3.加入 1-2mL 0.25%胰蛋白酶溶液(含 EDTA)，轻轻晃动培养瓶使之浸润所有细胞。 4.放入培养箱消化 2-3 分钟，显微镜下观察细胞消化情况，若细胞大部分变圆脱落，迅速拿回操作台。

传代步骤	5.加入 3-6mL 生长培养基终止消化，轻轻吹打细胞，完全脱落后吸出至离心管。 6.收集细胞悬液离心，1000rpm，5 分钟，弃去上清液。 7.加入 1-3mL 生长培养基重悬，吹打几下混匀细胞即可，按比例接种到新培养瓶，补足培养基至 8-10mL/瓶，拧松瓶盖或使用透气瓶盖进行培养。
消化时间	2-3min
传代比例(密度)	1:2-1:8
换液频次	2-3 天

参考资料：

细胞背景描述	JEG-3 是从 Erwin-Turner 肿瘤的 Woods 菌株中分离出来的具有上皮形态的超三倍体克隆来源的人类细胞系。该细胞系具有致瘤性，能够形成与绒毛膜癌一致的恶性肿瘤。表达基因:人绒毛膜促性腺激素(hCG);人绒毛膜促生长激素(胎盘乳原);孕激素。 这是一株超三倍体人类细胞株。 其典型染色体数为 71，发生率为 34%，多倍体率为 2.6%。 细胞入库精准代数 of P127 代。
倍增时间	~24-36hours
性别	男性
组织来源	胎盘病变；绒毛膜癌
细胞类型	肿瘤细胞
肿瘤类型	其它肿瘤细胞
生物安全等级	BSL-1
致瘤性	Yes, in nude mice; forms malignant tumor consistent with choriocarcinoma.
细胞保藏中心	ATCC; HTB-36 BCRC; 60428 BCRJ; 0123 DSMZ; ACC-463 ECACC; 92120308

推荐培养基：

产品货号	产品名称	规格
EM-JEG-3	人绒毛膜癌细胞 JEG-3 专用培养基	500mL

细胞冻存液：

产品货号	产品名称	规格
MB-C200	无血清细胞冻存液(无蛋白，5%DMSO)	100mL

细胞株培养扩增技术服务申明

本公司受贵单位委托，进行细胞株的技术服务工作，并收取相应细胞株技术服务费用，细胞株技术服务具体项目清单见订购合同。本公司提供完善的技术支持及售后服务，收到产品后处理方式及相应售后条款参见《细胞产品售后服务须知》。

收到常温细胞后如何处理？

- 1.收到常温细胞后，先不打开瓶盖，及时核对细胞瓶上标注的细胞名称与订购的细胞名称是否一致，及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
- 2.用 75%酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。将细胞置于细胞培养箱内静置培养 2-4 小时，以便稳定细胞状态。
- 3.仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性(贴壁/悬浮)、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
- 4.静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态(所拍照片将作为后续服务依据)；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
- 5.若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟代理商或我们联系；对于细胞培养操作及培养注意事项有疑问的，可跟我们的技术支持交流。

注意事项：

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 实验结果受多种因素影响，相关处理仅限于产品本身，不涉及其他赔偿。

免责声明：本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话：13564444959

官网：www.followme-shop.com

地址：北京市海淀区东北旺西路58号尚科办公社区C区一楼



公众号



客服